

Untersuchungen, Datum: 13. Oktober 2025, Seite: 1

Kunden: 5406, Schram, Marcus, Kalchreuth, Telefon: 0 17 29 70 91 10

Tiere: 14695, Nelly, Hund, Aussiedoodle, 12.08.2017, 8 Jahre 2 Monate

Behandlungen: 07.10.2025, Astrid Bjerning, Kotuntersuchung, 25-006643BP

Untersuchung: easyLAB, 13.10.2025 16:35

Informationen

Auftragsnummer: VB924466
Anforderungsid: VB924466
Befundart: Endbefund
Auftragsbezogene Hinweise: 11.10.2025

Laborergebnis

Text
Profil PetChek
Dipylidium caninum-Bandwurm (Antigen-Immunassay)
Text: negativ
Hakenwürmer (Antigen-Immunassay)
Text: negativ
Spulwürmer (Antigen-Immunassay)
Text: negativ
Peitschenwürmer (Antigen-Immunassay)
Text: negativ
Giardien (Antigen-Immunassay)
Text: negativ
Cystoisospora (Antigen-Immunassay)
Text: negativ Die Untersuchung Cystoisospora Antigen wurde dem Fecal DX Antigen Profil, ohne zusätzliche Kosten, hinzugefügt. Erfahren Sie mehr über Cystoisospora und den Fecal Dx Antigen Test auf der IDEXX Website oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren IDEXX Vertriebsmitarbeiter. Methode: Fluoreszenz-Immunoassay
Hinweis
Text: Das IDEXX Fecal Dx Antigen Profil plus Giardien weist Antigene von Spul-, Haken-, Peitschen- und Bandwürmern (Dipylidium caninum) in Kotproben nach. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass der Hund/ die Katze einen Wurmbefall aufweist. Im Falle eines positiven Ergebnisses sind entsprechende Maßnahmen erforderlich. Dazu gehört eine angemessene Behandlung, die Kontrolle von Zwischenwirten/Vektoren, zusätzliche Hygienemaßnahmen und Veränderungen in der Umgebung des Tieres. Die regelmäßige Durchführung einer koprologischen Untersuchung des Kots basiert auf der Risikobewertung des Lebensstils und ist von der ESCCAP empfohlen (Ref. ESCCAP GL1: Bekämpfung von Würmern (Helminthen) bei Hunden und Katzen). Dies kann eine gute Alternative für die standardisierte Entwurmungsempfehlung sein. Bei der Untersuchung auf Giardien identifiziert der Test Proteine, die vom Parasiten freigesetzt werden. Ein positives Ergebnis ist mit einer akuten oder chronischen Infektion vereinbar. Weitere Schritte müssen anhand des klinischen Bildes, der Lebensbedingungen des Tieres und anderer individueller Faktoren beurteilt werden. Bitte beachten Sie: Zusätzliche Untersuchungen aus Kotproben können innerhalb von 2 Tagen nach Probeneingang angefordert werden. Methode: Fluoreszenz-Immunoassay